

腫瘍内科

H27. 4. 27登録

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与方法	投与日	間隔	備考
悪性黒色腫	①	ダカルバジン	1000mg/m ²	div	day1	3W	
	②	オブジーボ	240mg/body	div	day1	2W	※インラインフィルター
	③	オブジーボ	80mg/body	div	day1	3W	4コースまで。
		ヤーボイ	3mg/kg	div	day1		
	④	オブジーボ	480mg/body	div	day1	4W	
	胃癌	①	アブラキサン	100mg/m ²	div	day1,8,15	4W
サイラムザ			8mg/kg	div	day1,15		
②		サイラムザ	8mg/kg	div	day1,15	4W	
		ロンサーフ	35mg/m ² /回	p.o. 1日2回	day1-5,8-12		
③		オブジーボ	360mg/body	div	day1	3W	※インラインフィルター
		TS-1	80mg/m ²	p.o.	day1-14		
		オキサリプラチン	100mg/m ²	div	day1		
④		オブジーボ	360mg/body	div	day1	3W	※インラインフィルター
		カペシタビン	2000mg/m ²	p.o.	day1-14		
		オキサリプラチン	130mg/m ²	div	day1		
⑤		オブジーボ	240mg/body	div	day1	2W	※インラインフィルター
		オキサリプラチン	85mg/m ²	div	day1		
		レボホリナート	200mg/m ²	div	day1		
		5-FU	400mg/m ²	div	day1		
		5-FU	2400mg/m ²	div	day1~3(持続)		
膵癌	①	オキサリプラチン	85mg/m ²	div	day1	2W	2h
		イリノテカン	180mg/m ²	div	day1		1.5h
		レボホリナート	200mg/m ²	div	day1		2h
		5-FU	400mg/m ²	急速div	day1		bolus
		5-FU	2400mg/m ²	div	day1-2(持続)		46h
大腸癌	①	アバスチン	5mg/kg	div	day1	2W	
		レボホリナート	200mg/m ²	div	day1		
		5-FU	400mg/m ²	div	day1		
		5-FU	2400mg/m ²	div	day1~3(持続)		

	②	アバスチン	5mg/kg	div	day1		
		ユーエフティ	<1.17:300mg/d 1.17-1.49:400mg/d 1.5-1.83:500mg/d 1.83<600mg/d	p.o	day1-21	4W	
		ユーゼル	75mg/m ²	p.o	day1-21		
膵・消化管 神経内分泌腫瘍	①	ザノサー	1000mg/m ²	div	day1	1W	
MSI-Highを有する 固形癌	①	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	
食道癌	①	オプジーボ	240mg/body	div	day1	2W	adjuvant 16週まで① 17週以降②
	②	オプジーボ	480mg/body	div	day1	4W	
	③	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	CDDPIはmax6コース NAC→手術後の adjuvant
		5-FU	800mg/m ²	div	day1~5		
		シスプラチン	80mg/m ²	div	day1		
	④	オキサリプラチン	85mg/m ²	div	day1	2W	
		レボホリナート	200mg/m ²	div	day1		
		5-FU	400mg/m ²	div	day1		
		5-FU	2400mg/m ²	div	day1~3(持続)		
	⑤	オキサリプラチン	85mg/m ²	div	day1	2W	開始3コースRT併用 その後さらに3コース
		レボホリナート	200mg/m ²	div	day1		
		5-FU	400mg/m ²	div	day1		
		5-FU	1600mg/m ²	div	day1~3(持続)		

H27.4.27新設
H27.4.27更新(悪性黒色腫①追加)
H27.10.7更新(悪性黒色腫②追加)
H29.3.19更新(胃癌①膵癌①追加)
H31.1.21更新(MSI-Highを有する固形癌①追加)
R1.6.25更新(悪性黒色腫③追加)
R2.3.4更新(食道癌①追加)
R3.6.4更新(胃癌②追加)
R3.11.26更新(胃癌③④⑤ 食道癌①②③)
R3.12.15更新(食道がん④⑤)