

消化器内科

※H18. 10. 23更新

H21.4.16外来化学療法委員会において確認

| 対象疾患 | No | 抗癌剤 | 標準投与量 | 投与経路・投与方法 | 投与日 | 間隔 | 備考 |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|--|
| 肝細胞癌 | ① | エピルビシン | 40～70mg/body | 経カテーテル・肝動注 | 不定期 | 不定期 | 常に100mg処方 |
| | | ※リピオドール併用。ゼラチンスポンジ併用する場合もあり | | | | | |
| | | マイトマイシンS | 4～10mg/body | 経カテーテル・肝動注 | 不定期 | 不定期 | 常に20mg処方 |
| | | ※上記薬剤と併用することが多い | | | | | |
| | ② | エピルビシン | 40～70mg/body | 経リザーバー・肝動注 | day1 | 3～4W | 常に100mg処方 |
| | | マイトマイシンS | 4～10mg/body | 経リザーバー・肝動注 | day1 | 3～4W | 常に20mg処方 |
| | | ※リピオドール併用する場合あり | | | | | |
| | ③ | アイエーコール | 65mg/m ² | 経カテーテル・肝動注 | day1 | 4～6W | |
| | ④ | 5-FU | 300mg/m ² /day | 経リザーバー・肝動注 | day1～14 | 4W | |
| | ⑥ | サイラムザ | 8mg/kg | div | day1 | 2W | |
| 膵臓癌 | ① | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | div | day1,8,15 | 4W | ※実際には骨髄抑制等によりdose downあるいは、投与間隔をあける場合が多い |
| | | | | | | | |
| | ② | TS-1 | 60mg/m ² | po | day1-15 | 3W | |
| | | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | div | day8,15 | | |
| | ③ | アブラキサン | 125mg/m ² | div | day1,8,15 | 4W | |
| ゲムシタビン | | 1000mg/m ² | div | day1,8,15 | | | |
| 局所進行膵癌 | ① | 5-FU | 300mg/m ² | 持続div | 5days/week | 放射線療法中 | |
| 膵臓癌及び転移性胃癌 | ① | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | div | day1,8 | 3W | |
| | | シスプラチン | 20mg/m ² | div | day1,8 | | |
| 癌性腹膜炎 | ① | シスプラチン | 100mg/body | 腹腔内 | 不定期 | 不定期 | |
| 肝神経内分泌細胞癌 | ① | アイエーコール | 65mg/m ² | 経カテーテル・肝動注 | day1 | 不定期 | |
| | | ラスツェット | 100mg/m ² | 経カテーテル・肝動注 | day1 | 不定期 | |
| 胃癌 | ① | イリノテカン | 80mg/m ² | div | day1,15 | 5W | |
| | | ティーエスワン | 80mg/m ² | po | day1～21 | | |
| | ② | イリノテカン | 60mg/m ² | div | day1 | 2W | |
| | | シスプラチン | 30mg/m ² | div | day1 | | |
| | ③ | オプジーボ | 240mg/body | div | day1 | 2W | |
| | 大腸癌 | ① | アバスチン | 5または10mg/kg | div | day1 | 2W |
| イリノテカン | | | 150mg/m ² | div | day1 | | |
| レボホリナート | | | 200mg/m ² | div | day1 | | |
| 5-FU | | | 400mg/m ² | div | day1 | | |
| 5-FU | | | 2400mg/m ² | div | day1～3(持続) | | |
| クローン病 | ① | レミケード | 5mg/kg | div | day1.15.43 | 以降は8週毎 | |
| | ② | レミケード | 10mg/kg | div | day1 | 8W | |
| 注釈: 初回投与から44日目以降(5mg/kgを3クール以上施行後のみ) | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------|--------|-----|------------|--------|
| 潰瘍性大腸炎 | ① | レミケード | 5mg/kg | div | day1.15.43 | 以降は8週毎 |
|--------|---|-------|--------|-----|------------|--------|

H20.4.10更新

H21.8.10更新(膵癌②追記)

H22.5.10更新(局所進行膵癌①登録漏れ追記)

H22.10.1更新(大腸癌①登録漏れ追記)

H22.11.11更新(クローン病①)

H22.11.11更新(潰瘍性大腸炎①)

H24.2.1更新(後発品の名称への変更GEM)

H25.10.17更新(クローン病②追加)

H25.11.6更新(胃癌②追加)

H26.12.24更新(膵癌③追加)

H29.11.10更新(胃癌③追加)

R1.10.4更新(肝細胞癌⑥追加)