

院内製剤及び適応外薬の医療行為への使用について一覧

(製)：院内製剤 ★：院内掲示による承諾

薬剤名	内 容	症 例
希釈ボスミン液 (製)	消化管出血に対して純エタノールあるいは高張食塩水エピネフリンなどの局注、エピネフリン添加生理食塩水の散布など	消化管出血
ルゴール液 (製)	内視鏡による食道観察時にヨード染色	内視鏡検査時
滅菌墨汁 (製)	大腸の腫瘍性病変に対して滅菌墨汁による点墨	大腸腫瘍性病変
ピオクタニン液 (製)	大腸の腫瘍性病変に対してクリスタルバイオレット (ピオクタニンブルー) による染色	大腸腫瘍性病変
VBS 吸入液 ★ (製)	V B S吸入液の院内製剤使用	ネブライザー
散瞳混合薬 ★ (製)	白内障術前 2 時間前から術前散瞳目的で散瞳混合薬を 20 分おきに点眼	白内障手術
自己血清 ★ (製)	重症ドライアイ患者に対して自己血清点眼液を院内製剤し処方	重症ドライアイ
HGX うがい薬★ (製)	HGX うがい液の使用	化学療法施行中の口内炎
トロンビン ★ (製)	トロンビン・フランセチンパウダーの使用	子宮腔部びらん面からの出血
フランセチン★ (製)		
3%酢酸液 ★ (製)	「3%滅菌酢酸液」の使用	コルポスコピー
リファンピシ液 (製)	心臓バイパス手術に 0.1%リファンピシン液の使用	心臓バイパス手術
S A D B E 液 (製)	脱毛症に S A D B E 液の使用	脱毛症
グルタルアルデヒド液 (製)	心臓手術に 0.6%グルタルアルデヒド溶液の使用	心臓弁膜症

(適)：適応外薬

薬剤名	内 容	症 例
リピオドール (適)	肝細胞癌に対しリピオドールを用いた肝動脈塞栓術	肝細胞癌
無水エタノール (適)	食道・胃静脈瘤に対し無水エタノールを用いた硬化療法	食道・胃静脈瘤
無水エタノール (適)	消化管出血に対して純エタノールあるいは高張食塩水エピネフリンなどの局注、エピネフリン添加生理食塩水の散布など	消化管出血
カナマイシン (適)	肝性脳症に対し腸管非吸収性抗菌薬投与	肝性脳症
アデホス注 (適)	「アデホス注」の肺静脈隔 (心房細動アブレーション) での再伝動の評価	肺静脈隔離
ピシバニール注 (適)	難治性気胸に対してピシバニールによる胸膜癒着	難治性気胸
エンドキサン注 (適)	免疫抑制剤による間質性肺炎の治療	間質性肺炎

2016.6.25